


HỆ THỐNG TOÀN BỘ CÔNG THỨC VẬT LÝ 12 TỪ A-Z

CÔNG THỨC VẬT LÝ 12



CÔNG THỨC VẬT LÝ 12



CHƯƠNG I : DAO ĐỘNG

I. DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA:

Chọn gốc tọa độ tại vị trí cân bằng:

+ Phương trình dao động:

$$x = A \cos(\omega t + \varphi)$$

+ Phương trình vận tốc:

$$v = -\omega A \sin(\omega t + \varphi)$$

+ Phương trình gia tốc:

$$a = -\omega^2 A \cos(\omega t + \varphi) = -\omega^2 x$$

- + x : Li độ dao động (cm, m)
- + A : Biên độ dao động (cm, m)
- + φ : Pha ban đầu (rad)
- + ω : Tần số góc (rad/s)
- + $(\omega t + \varphi)$: Pha dao động (rad)

$$\begin{aligned} x_{\max} &= A \\ v_{\max} &= \omega A \text{ (Tại VTCB)} \\ a_{\max} &= \omega^2 A \text{ (Tại biên)} \end{aligned}$$

* **Hệ thức độc lập:** $A^2 = x^2 + \frac{v^2}{\omega^2}$

$$\rightarrow v = \pm \omega \sqrt{A^2 - x^2}$$

- + Tại VTCB: $x=0, v_{\max} = \omega A, a = 0$
- + Tại biên: $x_{\max} = A, v = 0, a_{\max} = \omega^2 A$
- + Tốc độ trung bình trong 1 chu kì:

$$\bar{v} = \frac{4A}{T}$$

+ Liên hệ về pha:

- v sớm pha $\frac{\pi}{2}$ hơn x ;
- a sớm pha $\frac{\pi}{2}$ hơn v ; a ngược pha với x

II. CON LẮC Lò XO:

☞ Tần số góc: $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$

$$\Rightarrow k = m\omega^2, \omega = 2\pi f$$

☞ Chu kì: $T = \frac{2\pi}{\omega}, T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}$

☞ Tần số: $f = \frac{1}{T}, f = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{m}}$

☞ Nếu $m = m_1 + m_2 \Rightarrow$

$$T^2 = T_1^2 + T_2^2$$

☞ Nếu $m = m_1 - m_2 \Rightarrow T^2 = T_1^2 - T_2^2$

☞ Nếu trong thời gian t vật thực hiện được N dao động:

Chu kì $T = \frac{t}{N}$ Tần số $f = \frac{N}{t}$

☞ Cắt lò xo:

$$k.l = k_1.l_1 = k_2.l_2$$

☞ Ghép lò xo:

+ Nếu k_1 nối tiếp $k_2: \frac{1}{k} = \frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2}$

$$\Rightarrow T^2 = T_1^2 + T_2^2$$

+ Nếu k_1 song song k_2 : $k = k_1 + k_2$

$$\Rightarrow \frac{1}{T^2} = \frac{1}{T_1^2} + \frac{1}{T_2^2}$$

➔ Lập phương trình dao động điều hòa:

Phương trình có dạng:

$$x = A \cos(\omega t + \varphi)$$

+ Tìm A:

$$A^2 = x^2 + \frac{v^2}{\omega^2}, l = 2A, v_{\max} = \omega A, \dots$$

+ Tìm ω :

$$T = \frac{2\pi}{\omega}, \omega = 2\pi f, \omega = \sqrt{\frac{k}{m}} \dots$$

+ Tìm φ : Chọn $t = 0$ lúc vật qua vị trí

x_0

$$\Rightarrow x_0 = A \cos \varphi$$

$$\Rightarrow \cos \varphi = \frac{x_0}{A} = \cos \theta$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \varphi = \theta & \text{Vật CĐ theo chiều (-)} \\ \varphi = -\theta & \text{Vật CĐ theo chiều (+)} \end{cases}$$

➔ Năng lượng dao động điều hòa:

☑ Động năng:

$$W_d = \frac{1}{2} m v^2 = \frac{1}{2} k A^2 \sin^2(\omega t + \varphi)$$

☑ Thế năng:

$$W_t = \frac{1}{2} k x^2 = \frac{1}{2} k A^2 \cos^2(\omega t + \varphi)$$

☑ Cơ năng:

$$W = W_d + W_t = \text{hs}$$

$$W = \frac{1}{2} k A^2 = \frac{1}{2} m \omega^2 A^2 = \text{hs}$$

☑ Con lắc lò xo treo thẳng đứng:

Gọi l_0 : Chiều dài tự nhiên của lò xo

Δl : Độ dãn của lò xo khi vật ở VTCB

l_b : Chiều dài của lò xo khi vật ở VTCB

$$\Rightarrow l_b = l_0 + \Delta l$$

Khi vật ở VTCB:

$$F_{\text{đh}} = P$$

$$\Rightarrow k \Delta l = mg$$

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{g}{\Delta l}}$$

Chu kì của con lắc

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}} = 2\pi \sqrt{\frac{\Delta l}{g}}$$

Chiều dài của lò xo ở li độ x : $l = l_b + x$

➤ Chiều dài cực đại

(Khi vật ở vị trí thấp nhất) $l_{\max} = l_b + A$


\boxed{A}

➤ Chiều dài cực tiểu

(Khi vật ở vị trí cao nhất) $l_{\min} = l_b - A$

$$\Rightarrow A = \frac{l_{\max} - l_{\min}}{2};$$

$$l_b = \frac{l_{\max} + l_{\min}}{2}$$



★ **Lực đàn hồi của lò xo ở li độ x:**

$$F_{dh} = k(\Delta l + x)$$

➤ **Lực đàn hồi cực đại:**

$$F_{dhmax} = k(\Delta l + A)$$

➤ **Lực đàn hồi cực tiểu:**

$$F_{dhmin} = k(\Delta l - A) \text{ nếu } \Delta l > A$$

$$F_{dhmin} = 0 \text{ nếu } \Delta l \leq A$$

★ **Lực hồi phục:**

Là lực tổng hợp tác dụng lên vật
(có xu hướng đưa vật về VTCB)

$$\text{Độ lớn } F_{hp} = |kx|$$

$$\Rightarrow \text{Lực hồi phục cực đại: } F_{hp} = |kA|$$

Lưu ý: Trong các công thức về lực và năng lượng thì A, x, Δl có đơn vị là (m).

III. CON LẮC ĐƠN

☞ **Tần số góc:** $\omega = \sqrt{\frac{g}{l}}$

☞ **Chu kỳ:** $T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}$ l(m), g(m/s²)

☞ **Tần số:** $f = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{g}{l}}$ (Hz)

Phương trình dao động:

Theo cung lệch: $s = s_0 \cos(\omega t + \varphi)$

Theo góc lệch: $\alpha = \alpha_0 \cos(\omega t + \varphi)$

Với $s = l\alpha$

l là chiều dài dây treo (m)

α_0, s_0 là góc lệch, cung lệch khi vật ở biên

+ Công thức liên hệ: $S_0^2 = s^2 + \frac{v^2}{\omega^2}$

Và $v = \pm \omega \sqrt{S_0^2 - s^2}$

Vận tốc:

☒ Khi dây treo lệch góc α bất kì:

$$v = \sqrt{2gl(\cos \alpha - \cos \alpha_0)}$$

☒ Khi vật qua VTCB:

$$v = \sqrt{2gl(1 - \cos \alpha_0)}$$

☒ Khi vật ở biên: $v = 0$

Lực căng dây:

☒ Khi vật ở góc lệch α bất kì:

$$T = mg(3 \cos \alpha - 2 \cos \alpha_0)$$

☒ Khi vật qua VTCB

$$T = mg(3 - 2 \cos \alpha_0)$$

☒ Khi vật ở biên:

$$T = mg \cos \alpha_0$$

Khi $\alpha \leq 10^\circ$ Có thể dùng

$$1 - \cos \alpha_0 = 2 \sin^2 \frac{\alpha_0}{2} \approx \frac{\alpha_0^2}{2}$$

$$\Rightarrow T_{max} = mg(1 + \alpha_0^2);$$

$$T_{min} = mg(1 - \frac{\alpha_0^2}{2})$$

★ **Năng lượng dao động:**

$$W = W_d + W_t = \text{hs}$$

$$W = mgl(1 - \cos \alpha_0) \approx \frac{1}{2} mgl \alpha_0^2$$

☑ Chu kì tăng hay giảm theo %:

$$\frac{|T_2 - T_1|}{T_1} \cdot 100\%$$

☑ Chiều dài tăng hay giảm theo %:

$$\frac{|l_2 - l_1|}{l_1} \cdot 100\%$$

☑ Gia tốc tăng hay giảm theo %:

$$\frac{|g_2 - g_1|}{g_1} \cdot 100\%$$

IV. TỔNG HỢP DAO ĐỘNG

Xét 2 dao động điều hòa cùng phương cùng tần số:

$$x_1 = A_1 \cos(\omega t + \varphi_1)$$

$$\text{và } x_2 = A_2 \cos(\omega t + \varphi_2)$$

$$\text{Độ lệch pha: } \Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1$$

Phương trình dao động tổng hợp có dạng:

$$x = A \cos(\omega t + \varphi)$$

Với:

$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos(\varphi_2 - \varphi_1)}$$

$$\text{tg } \varphi = \frac{A_1 \sin \varphi_1 + A_2 \sin \varphi_2}{A_1 \cos \varphi_1 + A_2 \cos \varphi_2}$$

☒ Nếu 2 dao động cùng pha:

$$\Delta\varphi = 2k\pi$$

☒ Nếu 2 dao động ngược pha:

$$\Delta\varphi = (2k + 1)\pi$$

+ Nếu $\vec{A}_1 \perp \vec{A}_2$ thì $A^2 = A_1^2 + A_2^2$

+ Nếu \vec{A} tổng là đường chéo hình thoi

$$\Delta\varphi = 120^\circ \Rightarrow A = A_1 = A_2$$

+ Nếu \vec{A} tổng là hình thoi $\Delta\varphi = 60^\circ$

$$\Rightarrow A = A_1\sqrt{3} = A_2\sqrt{3}$$

CHƯƠNG II: SÓNG CƠ HỌC

* Sóng do 1 nguồn

Xét sóng tại nguồn O có biểu thức

$$u_o = A \cos \omega t$$

Biểu thức sóng tại M cách O khoảng d:

$$u_M = A \cos\left(\omega t - \frac{2\pi d}{\lambda}\right)$$

Với: $\omega = 2\pi f$

$$+ \text{ Bước sóng: } \lambda = \frac{v}{f} = v.T$$

$$+ \text{ Vận tốc truyền sóng: } v = \frac{s}{t}$$

* Độ lệch pha giữa 2 điểm trên phương truyền sóng cách nhau 1 khoảng d:

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi d}{\lambda}$$

➤ Nếu 2 dao động cùng pha:

$$\Delta\varphi = 2k\pi \Rightarrow d = k\lambda$$

➤ Nếu 2 dao động ngược pha:

$$\Delta\varphi = (2k + 1)\pi \Rightarrow d = \left(k + \frac{1}{2}\right)\lambda$$

*** Giao thoa sóng:**

Xét sóng tại 2 nguồn A và B là 2 sóng kết hợp có biểu thức: $u = A\cos\omega t$

+ Xét điểm M cách nguồn A một khoảng d_1 , cách nguồn B một khoảng d_2

+ Biểu thức sóng tại M do A truyền tới:

$$u_1 = A\cos\left(\omega t - \frac{2\pi d_1}{\lambda}\right)$$

+ Biểu thức sóng tại M do B truyền tới:

$$u_2 = A\cos\left(\omega t - \frac{2\pi d_2}{\lambda}\right)$$

⇒ Biểu thức sóng tổng hợp tại M :

$$u_M = u_1 + u_2$$

► **Biên độ:** $A = 2A \left| \cos\left(\frac{d_2 - d_1}{\lambda}\right) \cdot \pi \right|$

+ **Cực đại giao thoa:**

$$A_{\max} = 2A \Rightarrow d_2 - d_1 = k\lambda$$

+ **Cực tiểu giao thoa:**

$$A_{\min} = 0 \Rightarrow d_2 - d_1 = \left(k + \frac{1}{2}\right)\lambda$$

Để tìm số cực đại giao thoa:

$$\Delta\varphi = 2k\pi \Rightarrow d_2 - d_1 = k\lambda$$

và $d_1 + d_2 = S_1S_2$

Để tìm số cực tiểu giao thoa:

$$\Delta\varphi = (2k + 1)\pi$$

$$\Rightarrow d_2 - d_1 = \left(k + \frac{1}{2}\right)\lambda$$

và $d_1 + d_2 = S_1S_2$

* Trường hợp sóng phát ra từ hai nguồn lệch pha nhau $\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1$ thì số cực đại và cực tiểu trên đoạn thẳng S_1S_2

là số các giá trị của k ($\in \mathbb{Z}$) tính theo công thức:

Cực đại:

$$-\frac{S_1S_2}{\lambda} + \frac{\Delta\varphi}{2\pi} < k < \frac{S_1S_2}{\lambda} + \frac{\Delta\varphi}{2\pi}$$

Cực tiểu:

$$-\frac{S_1S_2}{\lambda} - \frac{1}{2} + \frac{\Delta\varphi}{2\pi} < k < \frac{S_1S_2}{\lambda} - \frac{1}{2} + \frac{\Delta\varphi}{2\pi}$$

⇒ **Sóng dừng:**

Gọi l là chiều dài của dây, k số bó sóng:

+ Nếu đầu A cố định, B cố định:

$$l = k \frac{\lambda}{2}$$

+ Nếu đầu A cố định, B tự do:

$$l = \left(k + \frac{1}{2}\right) \frac{\lambda}{2}$$

CHƯƠNG 3 : DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

I. ĐẠI CƯƠNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

Biểu thức cường độ dòng điện và điện áp

$$i = I_0 \cos(\omega t + \varphi_i)$$

và $u = U_0 \cos(\omega t + \varphi_u)$

độ lệch pha của u so với i : $\varphi = \varphi_u - \varphi_i$

+ $\varphi > 0$: u nhanh pha hơn i

+ $\varphi < 0$: u chậm pha hơn i

+ $\varphi = 0$: u, i cùng pha

☑ Mạch chỉ có R:

$\varphi = 0, \Rightarrow u_R, i$ cùng pha

$$U_{0R} = I_0 R; U_R = I \cdot R$$

☑ Mạch chỉ có cuộn cảm L:

➤ Cảm kháng $Z_L = \omega L$

$\varphi = \frac{\pi}{2} \Rightarrow u_L$ nhanh pha hơn $i: \frac{\pi}{2}$

$$U_{0L} = I_0 \cdot Z_L; U_L = I \cdot Z_L$$

☑ Mạch chỉ có tụ điện C:

➤ Dung kháng $Z_C = \frac{1}{\omega C}$

$\varphi = -\frac{\pi}{2} \Rightarrow u_C$ chậm pha hơn $i: \frac{\pi}{2}$

$$U_{0C} = I_0 \cdot Z_C; U_C = I \cdot Z_C$$

➔ Đoạn mạch R, L, C nối tiếp:

➤ Tổng trở: $Z = \sqrt{R^2 + (Z_L - Z_C)^2}$

Độ lệch pha của u so với i :

$$\operatorname{tg} \varphi = \frac{Z_L - Z_C}{R}$$

➤ Định luật ohm:

$$U_0 = I_0 \cdot Z; U = I \cdot Z$$

Lưu ý: Số chỉ Ampe kế: $I = \frac{I_0}{\sqrt{2}}$

Số chỉ vôn kế: $U = \frac{U_0}{\sqrt{2}}$

➔ Công suất mạch RLC:

$$P = UI \cos \varphi; P = RI^2 = U_R \cdot I$$

Hệ số công suất mạch: $\cos \varphi = \frac{R}{Z}$

*** Mạch RLC cộng hưởng:**

Thay đổi L, C, ω đến khi $Z_L = Z_C$

Khi đó $Z_{\min} = R \Rightarrow I_{\max} = \frac{U}{Z_{\min}}$

$$\Rightarrow P_{\max} = R \cdot I_{\max}^2 = \frac{U^2}{R}$$

*** Điều kiện công hưởng:**

- + Công suất mạch cực đại
- + Hệ số công suất cực đại
- + Cddd, số chỉ ampe kế cực đại
- + u, i cùng pha

Cuộn dây có điện trở trong r:

➤ Tổng trở cuộn dây:

$$Z_d = \sqrt{r^2 + Z_L^2}$$

➤ Độ lệch pha giữa u_d và i :

$$\operatorname{tg} \varphi_d = \frac{Z_L}{r}$$

➤ Công suất cuộn dây: $P_d = r \cdot I^2$

➤ Hệ số công suất cuộn dây:

$$\cos \varphi_d = \frac{r}{Z_d}$$

Mạch RLC khi cuộn dây có điện trở r:

➤ Tổng trở:

$$Z = \sqrt{(R+r)^2 + (Z_L - Z_C)^2}$$

➤ Độ lệch pha của u so với i :

$$\boxed{\operatorname{tg} \varphi = \frac{Z_L - Z_C}{R + r}}$$

➤ Công suất mạch: $\boxed{P = (R+r) \cdot I^2}$

➤ Hệ số công suất mạch:

$$\boxed{\cos \varphi = \frac{R + r}{Z}}$$

Ghép tụ điện: Khi C' ghép vào C tạo thành C_b

+ Nếu C_b < C: ⇒ C' ghép nt C

$$\Rightarrow \frac{1}{C_b} = \frac{1}{C} + \frac{1}{C'}$$

+ Nếu C_b > C: ⇒ C' ghép // với C

$$\Rightarrow \boxed{C_b = C + C'}$$

📖 Bài toán cực trị:

Thay đổi R để P_{max}:

Công suất $P = RI^2 =$

$$R \cdot \frac{U^2}{R^2 + (Z_L - Z_C)^2} = \frac{U^2}{R + \frac{(Z_L - Z_C)^2}{R}}$$

$$\text{Để } P_{\max} \Rightarrow \left[R + \frac{(Z_L - Z_C)^2}{R} \right]_{\min}$$

$$\Rightarrow R = \frac{(Z_L - Z_C)^2}{R}$$

$$\Rightarrow \boxed{R = |Z_L - Z_C|} \Rightarrow \boxed{P_{\max} = \frac{U^2}{2R}}$$

Thay đổi L để U_{Lmax}:

$$U_L = I \cdot Z_L = \frac{U \cdot Z_L}{\sqrt{R^2 + (Z_L - Z_C)^2}} =$$

$$\frac{U}{\sqrt{(R^2 + Z_C^2) \frac{1}{Z_L^2} - 2Z_C \cdot \frac{1}{Z_L} + 1}} = \frac{U}{\sqrt{y}}$$

Để U_{Lmax} thì y_{min} ⇒ y' = 0

$$\Rightarrow \boxed{Z_L = \frac{R^2 + Z_C^2}{Z_C}}$$

$$\Rightarrow \boxed{U_{L\max} = \frac{U}{R} \sqrt{R^2 + Z_C^2}}$$

Thay đổi C để U_{Cmax}:

$$\text{Trường tự: } \boxed{Z_C = \frac{R^2 + Z_L^2}{Z_L}};$$

$$\boxed{U_{C\max} = \frac{U}{R} \sqrt{R^2 + Z_L^2}}$$

II. LIÊN HỆ GIỮA CÁC ĐIỆN ÁP:

+ Hai đầu R có điện áp hiệu dụng U_R

+ Hai đầu L có điện áp hiệu dụng U_L

+ Hai đầu C có điện áp hiệu dụng U_C

➤ Điện áp hiệu dụng 2 đầu mạch:

$$\boxed{U = \sqrt{U_R^2 + (U_L - U_C)^2}}$$

➤ Độ lệch pha của u so với i:

$$\boxed{\operatorname{tg} \varphi = \frac{U_L - U_C}{U_R}}$$

➤ Hệ số công suất mạch:

$$\boxed{\cos \varphi = \frac{U_R}{U}}$$

Khi cuộn dây có điện trở trong:

$$\boxed{U = \sqrt{(U_R + U_r)^2 + (U_L - U_C)^2}}$$

Cuộn dây có:

$$U_d = \sqrt{U_r^2 + U_L^2}$$

$$\operatorname{tg} \varphi_d = \frac{U_L}{U_r}; \quad \cos \varphi_d = \frac{U_r}{U_d}$$

III. SẢN XUẤT VÀ TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG

Máy phát điện xoay chiều 1 pha:

Tần số: $f = n \cdot p$

với p : Số cặp cực của nam châm.

n : Số vòng quay trong 1s

➤ **Suất điện động cảm ứng:**

$$e = E_0 \cos \omega t$$

➤ **Với SĐĐ cực đại:** $E_0 = NBS\omega$

➤ **Từ thông cực đại:** $\phi_0 = BS$

Nếu cuộn dây có N vòng: $\phi_0 = NBS$

+ **Mắc hình sao:**

$$U_d = \sqrt{3}U_p \quad \text{và} \quad I_d = I_p$$

+ **Mắc hình tam giác:**

$$U_d = U_p \quad \text{và} \quad I_d = \sqrt{3}I_p$$

Máy biến thế:

Gọi:

N_1, U_1, P_1 : Số vòng, hđt, công suất ở cuộn sơ cấp

N_2, U_2, P_2 : Số vòng, hđt, công suất ở cuộn thứ cấp

$$P_1 = U_1 I_1 \cos \varphi_1; \quad P_2 = U_2 I_2 \cos \varphi_2$$

➤ **Hiệu suất của máy biến thế:**

$$H = \frac{P_2}{P_1} \leq 1 \quad (\%)$$

➤ **Mạch thứ cấp không tải:**

$$k = \frac{N_1}{N_2} = \frac{U_1}{U_2}$$

➤ **Mạch thứ cấp có tải:**

$$k = \frac{N_1}{N_2} = \frac{U_1}{U_2} = \frac{I_2}{I_1}$$

Truyền tải điện năng:

➤ **Độ giảm thế trên dây dẫn:**

$$\Delta U = R_d I_d$$

➤ **Công suất hao phí trên đường dây tải điện:**

$$\Delta P = R_d I_d^2 = R \cdot \frac{P^2}{U^2}$$

Với R_d : điện trở tổng cộng trên đường dây tải điện

I_d : Cường độ dòng điện trên dây tải điện

+ **Hiệu suất tải điện:**

$$H = \frac{P_2}{P_1} = \frac{P_1 - \Delta P}{P_1} \quad \%$$

Với: P_1 : Công suất truyền đi

P_2 : Công suất nhận được nơi tiêu thụ

ΔP : Công suất hao phí

CHƯƠNG 4 : DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ

➤ Tần số góc: $\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}}$

➤ Chu kỳ riêng: $T = 2\pi\sqrt{LC}$

➤ Tần số riêng: $f = \frac{1}{T} = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$

Bước sóng điện từ:

$$\lambda = c \cdot T = \frac{c}{f} = c \cdot 2\pi\sqrt{LC}$$

Với $C_s = 3.10^8$ m/s: Vận tốc ánh sáng

Năng lượng mạch dao động:

☑ Năng lượng điện trường:

$$W_C = \frac{1}{2}Cu^2 = \frac{1}{2}qu = \frac{1}{2}\frac{q^2}{C}$$

⇒ Năng lượng điện trường cực đại:

$$W_{C\max} = \frac{1}{2}CU_0^2 = \frac{1}{2}Q_0U_0 = \frac{1}{2}\frac{Q_0^2}{C}$$

☑ Năng lượng từ trường: $W_L = \frac{1}{2}Li^2$

⇒ Năng lượng từ trường cực đại:

$$W_{L\max} = \frac{1}{2}LI_0^2$$

➤ Năng lượng điện từ: $W = W_C + W_L$

$$\begin{aligned} W &= \frac{1}{2}Cu^2 + \frac{1}{2}Li^2 \\ &= \frac{1}{2}qu + \frac{1}{2}Li^2 = \frac{1}{2}\frac{q^2}{C} + \frac{1}{2}Li^2 \end{aligned}$$

⇒

$$\begin{aligned} W &= W_{C\max} = W_{L\max} = \frac{1}{2}CU_0^2 \\ &= \frac{1}{2}Q_0U_0 = \frac{1}{2}\frac{Q_0^2}{C} = \frac{1}{2}LI_0^2 \end{aligned}$$

➤ Năng lượng điện trường và năng lượng từ trường biến thiên điều hòa với tần số gấp đôi của dòng điện và điện tích:

$$\left(2f, 2\omega, \frac{T}{2}\right)$$

CHƯƠNG 5 : GIAO THOA ÁNH SÁNG:

I) Với Ánh Sáng Đơn Sắc:

Gọi :


+ a: Khoảng cách giữa 2 khe S_1, S_2

+ D: Khoảng cách từ 2 khe tới màn

+ λ : Bước sóng của ánh sáng kích thích

+ x: Khoảng cách từ vị trí vân đang xét tới vân sáng trung tâm

+ Khoảng vân: $i = \frac{\lambda D}{a}$



+ Vị trí vân sáng: (Vân sáng thứ k)

$$x = k \frac{\lambda D}{a} = ki$$

+ **Vị trí vân tối:** (Vân tối thứ k+1)

$$x = \left(k + \frac{1}{2}\right) \frac{\lambda D}{a} = (k + 0,5).i$$

+ **Khoảng cách giữa 2 vân x_1 và x_2 :**

Cùng phía: $\Delta x = |x_1 - x_2|$

Khác phía: $\Delta x = x_1 + x_2$

+ **Xét tại vị trí x cách vân trung tâm cho vân gì:**

$$\frac{x}{i} = k \rightarrow \text{Vân sáng thứ } k$$

$$\frac{x}{i} = k + 0,5 \rightarrow \text{Vân tối thứ } k + 1$$

+ **Hai vân trùng nhau:** $x_1 = x_2$

+ **Tìm số vân sáng, vân tối quan sát được trên bề rộng trường giao thoa L:**

Số khoảng vân trên nửa trường: $n = \frac{L}{2i}$

$$N_s = (\text{phần nguyên của } n) \times 2 + 1$$

$$N_t = (\text{phần làm tròn của } n) \times 2$$

II) Giao Thoa Với Ánh Sáng Trắng:

$$0,4\mu m \leq \lambda \leq 0,75\mu m$$

+ **Bề rộng quang phổ bậc 1:** với $k = 1$

$$\Delta x_1 = x_{d1} - x_{t1} = k \frac{D}{a} (\lambda_d - \lambda_t)$$

+ **Bề rộng quang phổ bậc 2:**

$$\Delta x_2 = 2\Delta x_1$$

+ **M cách VS trung tâm 1 khoảng x cho bao nhiêu vân sáng, bao nhiêu vân tối:**

+ **Tại M cho vân sáng:** $x_M = k \frac{\lambda D}{a}$

$$\Rightarrow \lambda = \frac{ax_M}{k.D} (\mu m)$$

$$\Rightarrow 0,4\mu m \leq \frac{ax_M}{k.D} \leq 0,75\mu m$$

\Rightarrow **Các giá trị của k (k nguyên),**

+ **Tại M cho vân tối:**

$$x_M = \left(k + \frac{1}{2}\right) \frac{\lambda D}{a}$$


$$\Rightarrow \lambda = \frac{ax_M}{\left(k + 0,5\right).D}$$

$$\Rightarrow 0,4\mu m \leq \frac{ax_M}{\left(k + 0,5\right).D} \leq 0,75\mu m$$

\Rightarrow **Các giá trị của k (k nguyên),**

CHƯƠNG 6 : LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG:

Gọi



+ λ : Bước sóng ánh sáng kích thích

+ λ_0 : Bước sóng giới hạn của kim loại

Điều kiện xảy ra hiện tượng quang điện: $\lambda \leq \lambda_0$

Năng lượng của photon ánh sáng:

$$\varepsilon = hf = \frac{hc}{\lambda} \quad (\text{J})$$

Công thoát của electron : $A = \frac{hc}{\lambda_0} \quad (\text{J})$

Phương trình Anhtanh:

$$\varepsilon = A + W_{d0\max}$$

Với $W_{d0\max} = e|U_h| = \frac{1}{2}mv_{0\max}^2$

U_h là hiệu điện thế hãm

Hiệu điện thế giữa Anốt và Catốt:

$$U_{AK} = -U_h$$

Các hằng số:

$$h = 6,625 \cdot 10^{-34} \text{J.s}; \quad c = 3 \cdot 10^8 \text{m/s},$$

$$e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{C}; \quad m_e = 9,1 \cdot 10^{-31} \text{kg}$$

Cường độ dòng quang điện:

$$I_{bh} = \frac{n_e \cdot e}{t} \quad (\text{A})$$

Công suất nguồn bức xạ: $P = \frac{n_p \cdot \varepsilon}{t}$

W

Hiệu suất lượng tử: $H = \frac{n_e}{n_p} \quad (\%)$

Với: n_e : Số electron bức ra khỏi Catốt

n_p : Số photon đến đập vào Catốt

Quang phổ nguyên tử hydro:

Năng lượng bức xạ hay hấp thụ :

$$\frac{hc}{\lambda} = E_{cao} - E_{thấp} \quad E = -\frac{13,6}{n^2} \quad (\text{eV})$$

$$1\text{eV} = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{J}$$

+ Bước sóng của các vạch:

$$\lambda_{31} = \frac{\lambda_{32} \cdot \lambda_{21}}{\lambda_{32} + \lambda_{21}}$$

+ Dãy Laiman:

Nằm trong vùng tử ngoại

+ Dãy Banme:

Nằm trong vùng ánh sáng nhìn thấy và một phần ở vùng tử ngoại

+ Dãy Pasen:

Nằm trong vùng hồng ngoại

CHƯƠNG 7 : VẬT LÝ HẠT NHÂN

Cấu tạo hạt nhân:

+ Hạt nhân ${}_Z^A X$, có A nuclon; Z proton; $N = (A - Z)$ notrôn.

+Liên hệ giữa năng lượng và khối lượng:

$$E = mc^2.$$

+ Độ hụt khối của hạt nhân :

$$\Delta m = Zm_p + (A - Z)m_n - m_{nh}$$

Năng lượng liên kết:

$$W_{lk} = \Delta m \cdot c^2.$$

Năng lượng liên kết riêng: $W_{lkr} =$

$$\frac{W_{lk}}{A}$$

Phóng xạ:

Gọi T: Là chu kỳ bán rã

t: Thời gian phóng xạ

Hằng số phóng xạ: $\lambda = \frac{\ln 2}{T}$

Gọi m_0 : Khối lượng chất phóng xạ lúc đầu (g)

m: Khối lượng chất phóng xạ còn lại

N_0 : Số nguyên tử ban đầu

N: Số nguyên tử còn lại

A: Số khối hạt nhân

H_0 : Độ phóng xạ lúc đầu (Bq)

H: Độ phóng xạ lúc sau (Bq)

$$m = m_0 \cdot 2^{-\frac{t}{T}} = m_0 \cdot e^{-\lambda t}$$

$$N = N_0 \cdot 2^{-\frac{t}{T}} = N_0 \cdot e^{-\lambda t}$$

$$H = \lambda N = \lambda \cdot N_0 \cdot 2^{-\frac{t}{T}} = H_0 \cdot 2^{-\frac{t}{T}}$$

Chú ý: Trong công thức về độ phóng xạ, T tính bằng giây ; $1\text{Ci} = 3,7 \cdot 10^{10}$ Bq

$$N_0 = \frac{m_0}{A} \cdot N_A$$

$$N = \frac{m}{A} \cdot N_A$$

Khối lượng hạt nhân mẹ bị phân rã sau thời gian t:

$$\Delta m = m_0 (1 - 2^{-\frac{t}{T}})$$

Số hạt nhân con mới được tạo thành bằng số hạt nhân mẹ bị phân rã sau thời gian t:

$$N' = \Delta N = N_0 - N = N_0 (1 - 2^{-\frac{t}{T}})$$

Tỉ lệ hạt nhân còn lại: $\frac{N}{N_0}$ (%)

Tỉ lệ hạt nhân bị phân rã: $\frac{\Delta N}{N_0}$ (%)

Các loại hạt phóng xạ:

+ Hạt α : ${}^4_2\text{He}$


+ Hạt β^+ : 0_1e ; Hạt β^- : ${}^0_{-1}e$

+ Hạt nơ tron: 1_0n

+ Hạt prôtôn: 1_1p hay 1_1H

Phản ứng hạt nhân:

Trong phản ứng hạt nhân:



+ Số nuclôn và số điện tích được bảo toàn:

$$\boxed{A_1 + A_2 = A_3 + A_4 \text{ và } Z_1 + Z_2 = Z_3 + Z_4.}$$

+ Năng lượng tỏa ra hoặc thu vào trong phản ứng hạt nhân:

$$W = (m_1 + m_2 - m_3 - m_4)c^2$$

$$\boxed{W = (m_1 + m_2 - m_3 - m_4)931,5\text{MeV}}$$

$$W = (\Delta m_3 + \Delta m_4 - \Delta m_1 - \Delta m_2) \cdot c^2$$

$$= A_3 W_{\text{lkr}3} + A_4 W_{\text{lkr}4} - A_1 W_{\text{lkr}1} - A_2 W_{\text{lkr}2}$$

+ Nếu $m_1 + m_2 > m_3 + m_4 \Rightarrow W > 0$
thì phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng.

+ Nếu $m_1 + m_2 < m_3 + m_4 \Rightarrow W < 0$
thì phản ứng hạt nhân thu năng lượng.

Khối lượng prôtôn: $m_p = 1,0073u$

Khối lượng notron $m_n = 1,0087u$

$$1u = 931,5 \frac{\text{MeV}}{c^2}$$